

# LESIONI ALLA NASCITA E PARALISI CEREBRALE INFANTILE



Paralisi cerebrale infantile, danni da parto e responsabilità medico-sanitaria

La paralisi cerebrale infantile (PCI) è causata da un difetto o da una lesione al cervello in via di sviluppo del feto, del neonato o del bambino. Gli errori medici legati alla gravidanza, alle indagini prenatali, al travaglio, al parto ed all'assistenza neonatale possono causare paralisi cerebrale infantile.

## CAUSE E FATTORI DI RISCHIO

- PREECLAMPSIA
- CORIOAMNIONITE
- VAGINOSI BATTERICA
- STREPTOCOCCO DEL GRUPPO B (SBEGB)
- PARTO VAGINALE DOPO TAGLIO CESAREO
- INFEZIONE DELLE VIE URINARIE (UTI)
- VILLITE
- DIABETE GESTAZIONALE
- OLIGOIDRAMNOS

Problemi di salute materna



Danni da parto da trauma

- EMORRAGIE INTRACRANICHE
- LESIONI DA VENTOSA OSTETRICA
- LESIONI DA FORPICE
- GRAVIDANZA OLTRE IL TERMINE
- LEUCOMALACIAPERIVENTRICOLARE (PVL)
- FORTI CONTRAZIONI E IPERSTIMOLAZIONE

- PRESENTAZIONE PODALICA
- PRESENTAZIONE DI FACCIA
- SPROPORZIONE CEFALOPELVICA (CPD) O FOTOPELVICA
- MACROSOMIA

Dimensioni e presentazione fetale anomale




Lesioni durante il travaglio ed il parto

- ENCEFALOPATIA IPOSSICO ISCHEMICA
- PARTO PREMATURO
- ROTTURA PREMATURA DELLE MEMBRANE (PROM)
- DISTACCO DELLA PLACENTA
- ROTTURA DELL'UTERO
- CORDONE OMBELICALE AVVOLTO ATTORNO AL COLLO
- PROLASSO DEL CORDONE OMBELICALE
- COMPRESIONE DEL CORDONE OMBELICALE
- USO IMPROPRIO DI OSSITOCINA
- ERRORI NEL PARTO CESAREO

- ICTUS FETALE
- ITTERO, IPERBILIRUBINEMIA E KERNITTERO
- SEPSI NEONATALE
- MENINGITE NEONATALE

Condizioni fetali o neonatali trattate erroneamente



## EFFETTI COLLATERALI DELLA PARALISI CEREBRALE

DISABILITÀ DELLO SVILUPPO

DISTURBI DELL'ANDATURA

MENOMAZIONI UDITIVE

MENOMAZIONI COGNITIVE

DOLORE

DISORDINI DEL SONNO

MOVIMENTI E TREMORI INVOLONTARI

DISTURBI COMPORTAMENTALI

DIFFICOLTÀ DI APPRENDIMENTO

DISTURBI DELLA PAROLA E DEL LINGUAGGIO

MENOMAZIONI VISIVE

PROBLEMI DI ALIMENTAZIONE

EPILESSIA E DISTURBI CONVULSIVI

PROBLEMI DI CONTROLLO DELLA VESCICA

ADD/ADHD

## PCI E MALASANITÀ

Di seguito, si indicano alcune ipotesi di condotte mediche censurabili che possono causare PCI. Se tu o una persona cara avete vissuto scenari simili durante la gravidanza ed il parto, vi esortiamo a chiedere assistenza legale.

1

Mancata rilevazione e trattamento di segni di pericolo fetale risultanti dal tracciato CTG

2

Mancata diagnosi e trattamento di infezioni della madre o del bambino durante la gravidanza e il parto

3

Mancata rilevazione ed approfondimento diagnostico di eventuali fattori di rischio, segni e sintomi di EII

4

Mancata diagnosi e cura di patologie occorse alla madre ed al bambino durante gravidanza, travaglio, parto e periodo post-partum